



HOSPITAL  
SÍRIO-LIBANÊS



Educação do Paciente/Familiar

# Enoxaparina (Clexane®)



## Para que esse remédio é utilizado?

Enoxaparina é um remédio anticoagulante que serve para o tratamento e prevenção da formação de coágulos (trombose).



## Tempo de tratamento:

É de extrema importância que a Enoxaparina seja utilizada durante todo o tempo prescrito e orientado pelo seu médico.



## O que devo fazer quando esquecer alguma dose?

Prefira utilizar esse remédio sempre nos mesmos horários para que não haja esquecimentos. Se esquecer, aplique assim que lembrar. Porém, se for muito próximo do horário da próxima dose, pule a dose esquecida. Não tome duas doses ao mesmo tempo ou doses extras para compensar a esquecida.



## Quais as precauções que devo tomar?

Avise seu médico ou dentista que você está fazendo uso de anticoagulante antes de realizar procedimentos invasivos, como cirurgias, em razão do maior risco de sangramento que esse remédio pode causar. Há remédios que podem interagir com a Enoxaparina e aumentar ou diminuir seu efeito anticoagulante. Por isso, não tome remédios sem consultar um médico ou farmacêutico. Você pode estar se expondo a riscos.



## Quais efeitos indesejados esse remédio pode provocar?

Os efeitos indesejados mais comuns durante a terapia com Enoxaparina são: sangramentos ou sinais de sangramento (exemplos: vômitos com sangue, sangue na urina, fezes escurecidas ou avermelhadas, sangramento vaginal anormal, hematomas sem traumas locais). Se apresentar algum desses sintomas, procure imediatamente o serviço de saúde mais próximo.



## Onde e como devo guardar e/ou desprezar os remédios?

- Conservar em local seco, em temperatura ambiente e manter na embalagem original para proteger da umidade.
- Manter a medicação fora do alcance das crianças.
- Despreze a seringa, com a ponta virada para baixo, num recipiente rígido com tampa (como um recipiente plástico);
- Sempre feche o recipiente e guarde em lugar seguro até o próximo descarte, isto é, longe do alcance de crianças e animais;
- Quando o recipiente estiver cheio, feche-o corretamente e leve-o até a farmácia ou posto de saúde mais próximo, para que o resíduo seja encaminhado para incineração.



## Técnica de aplicação:




Figura 1




Figura 2



Figura 3



Figura 4

A seringa de Enoxaparina já vem preenchida e pronta para uso. Não pressione o êmbolo para expelir qualquer bolha de ar antes de administrar a injeção.

**1.** Retire a capa protetora da agulha (Figura 1). Uma gota pode aparecer na agulha e, caso isso ocorra, remova-a antes de injetar o remédio por meio de batidas suaves no corpo da seringa com a agulha apontada para baixo.

**2.** A injeção deve ser administrada com o paciente preferencialmente deitado, no tecido subcutâneo da parede abdominal, alternando entre os lados esquerdo e direito. O local de aplicação deve ser no abdome (Figura 2), com distância de 5 cm do umbigo (3 a 4 dedos). Não aplicar em cima de cicatrizes, áreas avermelhadas ou com inchaço (distância de 5 cm dessas áreas).

Caso seja necessário o uso de outros remédios por via subcutânea, manter a região abdominal exclusiva para o anticoagulante.

**3.** A agulha deve ser introduzida perpendicularmente na espessura de uma prega cutânea feita entre os dedos polegar e indicador. A prega deve permanecer durante todo o período da injeção (Figura 3).

**4.** O dispositivo de segurança será automaticamente ativado quando o êmbolo deixar de ser pressionado, protegendo completamente a agulha usada e sem causar desconforto ao paciente. A ativação do dispositivo de segurança só é possível se o êmbolo for completamente abaixado. Nota: o dispositivo de segurança somente poderá ser ativado com a seringa completamente vazia. (Figura 4).



## Dúvidas:

Use esse remédio conforme prescrito pelo seu médico. Em caso de dúvidas sobre remédios, o serviço de **Farmácia do Hospital Sírio-Libanês** disponibiliza o **Núcleo de Assistência Técnica e Educação Farmacêutica (NATEF)** para que os farmacêuticos possam esclarecê-las. **E-mail: [natef@hsl.org.br](mailto:natef@hsl.org.br) | Telefone: (11) 3394-4955.**

Farmacêutico Clínico:		
Data:	Celular Corporativo:	Telefone:
		(11) 3394-4955



**HOSPITAL  
SÍRIO-LIBANÊS**



Comitê de Ativação e  
Educação do Paciente